R

n°. 37.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

L'observation de Mr. Sauval chirurgien de
Mgr le marquis de Puisieulx a Sillery pres de
Reims, pour laquelle j'ay été nommé Commissaire,
fait mention du Déplacement du Calcaneum arrivé
à une fille de 6. ans, dont il n'a pas été possible de
decouvrir la cause. L'auteur dit que la reduction quoyque
heureusement faite, cette maladie (malgré ses soins) fut
néanmoins suivie d'un Depot tres considerable dont il
luy fut impossible de faire l'ouverture, tant étoit grande
l'opposition des parens de la Malade sur l'usage des
instrumens tranchans; mais dans une pareille circonstance
n'eut il pas été plus prudent de recourir au second
moyen que l'art nous fournit pour ouvrir les tumeurs
humorales, que d'exposer la malade à tous les Desordres
qu'on fait le sejour et la fusée des matieres; quoyqu'il
en soit, le pus ayant fusé (ainsi que l'avoit prevu Mr. Sauval)
~~ayant fusé~~ jusques au dessus du Genou, il luy donna issue
par une incision qui s'étendoit depuis la partie superieure
et interne de la jambe, jusques à la malleole du meme
coté.

ARC 41 n° 32

il me paroit quil eut été plus a propos de ne faire
dabord cette incision qu'à la partie la plus déclive de
l'abcès attendu que c'étoit la le premier siege de la matiere
et quil y avoit lieu de penser qu'elle trouveroit plus de
facilité pour se precipiter en bas, qu'elle n'en avoit eu
à fuser en haut, peut etre meme auroit on aussi evité
la contre-ouverture quil a fallu faire a la cuisse.
Cinq a six jours ensuite, l'auteur s'étant apperçeu d'un
commencement d'alteration au tibia il employa tres sagement
les remedes convenables pour en arreter le progrès; mais
sans aucun succès, ensorte que tout le corps du tibia luy
ayant paru carié, il prononça sur la necessité de faire
l'amputation et son sentiment fut étayé de celuy de M.rs
Museux et Caqué tous deux tres celebres chirurgiens de
l'hotel Dieu de Reims; mais les murmures et les oppositions
des interessés pour la malade lorsquil fut question de la
premiere operation et qui luy furent si funestes, se renouvellerent
(dit l'auteur) avec plus de force au seul mot d'amputation
mais dans ce second cas, ~~ils furent~~ la resistance fut tres avantageuse
a la malade, puisqu'elle fut ~~cause~~ cause de la conservation d'un
membre condamné a etre amputé. En effet m.r Sauveal
contraint de suivre le traitement de la maladie comme
il avoit fait jusques alors, tacha par tous les moyens

les mieux indiqués d'accelerer l'exfoliation ou pour mieux dire la chute de la portion cariée du tibia, et la nature l'ayant heureusement secondé, il eut la satisfaction de voir ses soins couronnés du succés le plus heureux. Ensorte qu'une nouvelle substance ayant remplie le vuide que laissa la portion d'os detachée, la playe s'est heureusement cicatrisée et l'enfant marche aujourdhuy avec facilité et meme assés vite.

j'ay veu un cas a peu pres semblable a celuy que rapporte l'auteur de cette observation. un malade dans l'hopital St. Eloy a montpellier avoit un ulcere à la partie inferieure de la jambe, compliqué de carie tres considerable laquelle interessoit l'etendue d'environ quatre travers de doigts de tout le cilindre du tibia ; tous les remedes convenables en pareil cas pour procurer l'exfoliation ayant été mis en usage sans aucun succés, et n'attendant plus rien de la nature, on se determina a scier haut et bas toute la portion cariée de l'os et cette tentative eut tout le succés que l'on pouvoit s'en promettre, car bientot apres une substance blanche et assés solide sembla se regenerer pour remplir la breche que causoit la portion du tibia retranchée enfortque et le malade guerit radicalement et marcha comme auparavant.

Au reste l'observation de Mr. Sauval nous ayant parue tres interessante, nous pensons qu'elle merite de trouver place parmi les memoires de l'academie. Didier

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE